

學術專論試題

產後出血

陳光昭 醫師

1. 根據世界衛生組織（WHO）估計，全世界大約有多少的產婦死亡是產後出血所造成的
 1. 1/2
 2. 1/3
 3. 1/4
 4. 1/5
2. 全世界的產後出血的準確發生率雖然很難評估，但是粗略估計產後出血的發病率約占產婦人數的
 1. 4-6%
 2. 8-10%
 3. 12-14%
 4. 16-18%
3. 傳統的產後出血定義是陰道分娩後出血量超過500毫升，或是剖腹產後出血量超過多少毫升以上
 1. 500
 2. 1000
 3. 1500
 4. 2000
4. 在妊娠晚期，子宮動脈的血流量是500至700毫升/分鐘，佔心臟輸出量的
 1. 5%
 2. 10%
 3. 15%
 4. 20%
5. 以下何者不是造成子宮收縮乏力的危險因子
 1. 絨毛膜羊膜炎
 2. 子癇前症
 3. 長時間使用子宮鬆弛劑
 4. 羊水過少
6. 滯留性胎盤的定義是胎兒娩出後幾分鐘內胎盤未娩出
 1. 30分
 2. 60分
 3. 90分
 4. 120分
7. 有關治療子宮收縮乏力的藥物，以下敘述何者為錯誤
 1. Oxytocin具有抗利尿激素特性，因此長時間大劑量使用會導致水中毒。
 2. Ergot alkaloids會導致血壓快速升高，妊娠高血壓或妊娠毒血症患者禁止使用。
 3. Prostaglandin可能會造成支氣管收縮和血壓快速升高，哮喘及高血壓患者禁止使用。
 4. Misoprostol是一種新的前列腺素F2 alpha類似物，價格便宜，可透過口服，陰道或直腸給藥。

8. 有關Recombinant Coagulation Factor VIIa (rFVIIa) (商品名：第七因子注射劑 NovoSeven) 的敘述何者為錯誤

1. 是一種『off-label use』藥物
2. 是基因工程合成的活化第七凝血因子
3. 和傷口處的組織因子結合，活化第十因子和第九因子達到形成纖維蛋白和止血的目的。
4. 主要適應症是產後出血

9. 以下何種治療方法不是屬於減少子宮的血液供應

1. B-Lynch縫合術
2. 動脈結紮術
3. 子宮填塞法(Bakri balloon)
4. 動脈栓塞術

10. 導致生殖道裂傷的危險因子以下何者為非

1. 器械助產(產鉗或真空吸引)
2. 胎位不正
3. 前置胎盤
4. 急產及肩難產



答案

1. (3) 2. (1) 3. (2) 4. (3) 5. (4)
6. (1) 7. (4) 8. (4) 9. (1) 10. (3)